



Lipoatròfia semicircular relacionada amb el treball

Objectiu

Difondre els coneixements adquirits a partir de les dades obtingudes del seguiment de casos de lipoatròfia semicircular (LS) en treballadors i treballadores a Catalunya des del 2007.

Aquests es poden resumir en:

- Les característiques de la patologia i com es diagnostica.
- Els factors de risc laborals.
- Les mesures preventives i correctores que cal adoptar als centres de treball per evitar l'aparició de casos o aconseguir-ne la millora en cas que n'apareguin.


Àmbit d'aplicació

Qualsevol centre de treball en què es puguin donar les condicions perquè apareguin casos de lipoatròfia semicircular i que es detallen en aquest document.

Què és la lipoatròfia semicircular?

La lipoatròfia semicircular és una alteració benigna, poc freqüent, deguda a una atrofia localitzada del teixit adipós subcutani, que

es caracteritza per l'aparició d'una o més depressions en forma de banda semicircular a la superfície cutània. Afecta principalment les cuixes i els avantbraços, si bé pot aparèixer en altres zones.



La lipoatròfia semicircular afecta sovint les cuixes.

La lipoatròfia semicircular forma part de les lipodistròfies, un grup heterogeni de trastorns d'etiologia diversa que afecten el teixit adipós i que es caracteritzen per la desaparició d'aquest en diferents parts del cos. Les lipodistròfies es classifiquen segons l'etiologia en congènites i adquirides i, segons la localització, en generalitzades (afecten tota la pell), parcials o localitzades. La lipoatròfia semicircular és una lipodistròfia adquirida i localitzada.